

様

説明日 年 月 日

担当薬剤師

★治療について

レジメン名	1コースの期間	診療科	適応疾患	コース数	コース開始日
mFOLFOX6+Nivolumab14	14日間	外科・内科	胃がん	コース目	

★治療スケジュール

以下の治療スケジュールで繰り返し行います。症状や経過に合わせて治療スケジュールが変わることがあります。

投与順	投与経路	薬品名	投与量 投与時間	実際の 投与量	実施日	
					1	2~14
1	点滴 静注	オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg /Body 30分	240mg	●	
2	点滴 静注	グラニセトロン (吐き気止め)	3mg/100mL 30分	3mg/100mL	●	
3	点滴 静注	オキサリプラチン 5%ブドウ糖注250mL	85mg/m ² 2時間	mg	●	
3	点滴 静注	レボホリナート 5%ブドウ糖注250mL	200mg/m ² 2時間	mg	●	
4	点滴 静注	フルオロウラシル 生理食塩液50mL	400mg/m ² 全開で	mg	●	
5	持続 静注	フルオロウラシル 生理食塩液50mL	2400mg/m ² 46時間 携帯型ディスプレイサポ ル注入器使用	mg	●	

★注意事項など

この用紙は、かかりつけ医や保険調剤薬局の薬剤師へご提示ください。

★保険調剤薬局薬剤師の方へ

服薬状況や副作用等報告事項がありましたら、「患者情報連絡書」にて報告をお願いします。

「患者情報連絡書」: 碧南市民病院HP→部門紹介→薬剤部→薬薬連携に掲載

FAX(地域連携室): 0566-46-3774

【緊急時連絡先】碧南市民病院 薬剤部 TEL: 0566-48-5050(代表)

● 倦怠感

治療開始2、3日後に症状があらわれることがあります。また、治療が継続することで徐々に出てくることもあります。症状が強い場合には、お薬で対応することがあります。

⇒無理に動こうとせず、安静にして様子を見て下さい。

● 皮膚症状

手のひらや足の裏が赤くはれたり、皮膚や爪が黒くなったりすることがあります。皮がめくれたり、ヒリヒリ・チクチクするような痛みがある時は主治医に申し出て下さい。

● 口内炎

治療開始1週間ほどで口の中や歯肉がしみる、ひりひりする、赤くなるといった症状が出ることもあり、うがい薬や口腔用の軟膏を使うことがあります。痛くて食事がとれない場合は、病院へ連絡して下さい。

⇒こまめにうがいや歯みがきをして、口の中を清潔に保って下さい。

● 過敏症

点滴中にアレルギー症状がおこることがあります。『息苦しい』『胸が苦しい』『心臓がドキドキする』『発疹がでる』『顔がほてる』『汗がでる』『顔や体がかゆい』などの症状がおこった時は、すぐにスタッフを呼んで下さい。

⇒アレルギー症状は、多くの場合、点滴を始めてから数分でおこります。

★すぐに連絡をいただきたい副作用

- ★「倦怠感(だるさ)」、「食欲不振」、「発熱」、「黄疸(目の白い部分や顔や手が黄色くなる)」、「発疹」、「吐き気・嘔吐」、「かゆみ」(肝機能障害)
- ★「激しい腹痛」、「激しい下痢」(腸炎)
- ★「階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる」、「空咳が出る」、「発熱する」このような症状が急に現れる、または以前から症状があった場合は、症状が急に悪くなる。(間質性肺炎)
- ★「皮膚のかゆみ」、「じんま疹」、「声のかすれ」、「くしゃみ」、「のどのかゆみ」、「息苦しさ」、「心臓がドキドキする」、「意識がもうろうとする」、「熱っぽい」、「急に寒気がする」、「ふらつく」(過敏症)
- ★「繰り返し運動で疲れやすい」、「まぶたが重い」、「足、腕に力が入らない」、「筋肉痛がある」、「ものが二重に見える」、「吐き気がする」、「動悸がする」、「赤褐色尿が出る」(重症筋無力症・心筋炎・筋炎・横紋筋融解症)
- ★「下痢(軟便)あるいは排便回数が増えた」、「便に血が混じる、便が黒い、便に粘り気がある」、「腹痛あるいは腹部の圧痛(押すなど圧迫した時に現れる痛み)がある」、「吐き気や嘔吐がある」(腸炎・重度の下痢)
- ★「体がだるい」、「体重が減る」、「のどが渇く」、「水を多く飲む」、「意識障害」、「尿の量が増える」(1型糖尿病)
- ★「鼻血」、「歯茎の出血」、「血が止まりにくい」、「点状や斑状の皮下出血」、「息切れ、息苦しい」、「体がだるい」、「顔色が悪い」、「かゆみ」、「発熱」、「寒気がする」(重篤な血液障害)
- ★「皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)」、「いつもより疲れやすい」(肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎)
- ★「いつもより疲れやすい」、「脱毛」、「体重増加あるいは体重減少」、「寒気がする」、「行動の変化がある(性欲が減る、いらいらする、物忘れしやすいなど)」、「便秘」(甲状腺機能障害)
- ★「運動のまひ」、「感覚のまひ」、「手足のしびれ」、「手足の痛み」(神経障害)
- ★「むくみ」、「尿量が減る、尿が出ない」、「貧血」、「血尿」、「発熱」(腎障害)
- ★「体がだるい」、「意識が薄れる」、「吐き気や嘔吐がある」、「食欲不振」(副腎障害)
- ★「発熱」、「失神」、「嘔吐」、「精神状態の変化がある」、「体の痛み」(脳炎)
- ★「全身に赤い斑点や水ぶくれが出る」、「ひどい口内炎」、「まぶたや眼の充血」、「粘膜のただれ」(重度の皮膚障害)
- ★「腫れ、むくみ」、「皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗褐色になる」(意識の低下、胸の痛み、息苦しい)(静脈血栓塞栓症)

※ここに記載した副作用以外にも、体の異常を感じたら病院にご連絡ください。碧南市民病院（代表）0566-48-5050